

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
Matemātikas katedra
Bakalaura studiju programma "Matemātika"

Studiju kurss

Polinomu algebra

8.lekcija

Docētājs: Dr. P. Daugulis

2012./2013.studiju gads

Saturs

1. Simetriskie polinomi	4
1.1. Permutācijas un to darbība uz polinomiem	4
1.1.1. Pamatfakti par permutācijām	4
1.1.2. Permutāciju darbība polinomu gredzenā	7
1.1.3. Simetrisko polinomu definīcija	8
1.1.4. Simetrisko polinomu klases	9
1.2. Simetrisko polinomu īpašības	12
1.2.1. Permutāciju darbības īpašības	12
1.2.2. Simetrisko polinomu struktūra	17
1.2.3. Simetriskie polinomi veido apakšgredzenu	20
1.3. Simetrisko polinomu pamatteorēma	20
1.4. Algoritmi SP izteikšanai ar elementāro SP palīdzību	24
1.4.1. Teorēmas algoritms	24
1.4.2. Nenoteikto koeficientu metode	25
2. 8.mājasdarbs	27
2.1. Obligātie uzdevumi	27

2.2. Paaugstinātas grūtības un pētnieciska rakstura uzdevumi 28

Lekcijas mērķis:

- apgūt simetrisko polinomu teorijas pamatus.

Lekcijas kopsavilkums:

- var definēt īpaša veida vairāku argumentu polinomus, kas nemainās, ja tajos tiek mainīti argumenti - simetriskos polinomus,
- var definēt vairākas simetrisko polinomu klases - elementāros polinomus, pakāpju polinomus u.c.
- katru simetrisko polinomu var izteikt kā polinomu no elementārajiem polinomiem.

Svarīgākie jēdzieni: monotons terms.

Svarīgākie fakti un metodes: permutācijas darbības īpašības, SP vecākā terma monotonitāte, SP izteikšana orbītu lineāras kombinācijas veidā, SP - apakšgredzens, SP pamatteorēma, elementarizācijas algoritmi.

1. Simetriskie polinomi

Šajā lekcijā apskatīsim polinomus virs lauka k . Teiksim, ka $f \in k[X_1, \dots, X_n]$ satur termu aX^μ , $a \neq 0$, ja $f = aX^\mu + \dots$

1.1. Permutācijas un to darbība uz polinomiem

1.1.1. Pamatfakti par permutācijām

Par kopas A *permutāciju* sauc bijektīvu funkciju

$$\sigma : A \rightarrow A.$$

Visu n elementu kopas $\{1, \dots, n\}$ permutāciju kopu apzīmē ar Σ_n .

1.1. piezīme. $|\Sigma_n| = n(n-1)(n-2)\dots 2 \cdot 1 = n!$

Permutācijas var uzdot šādos veidos:

- *attēlu saraksts* - $\sigma \rightsquigarrow (\sigma(1), \dots, \sigma(n))$;

- *horizontālais pieraksts* - $\sigma \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$
- *funkcionālais grafs* ar vienu vai diviem kopas eksemplāriem.

Katrā kopā A eksistē tikai viena universāli definēta permutācija - *vienības permutācija* id : $\text{id}(x) = x$.

Kopā Σ_n var definēt *kompozīcijas* operāciju. Ja ir dotas divas permutācijas σ_1 un σ_2 , tad to kompozīcija $\sigma_1\sigma_2$ ir definēta ar nosacījumu

$$(\sigma_1\sigma_2)(x) = \sigma_1(\sigma_2(x)), \forall x.$$

\forall permutācijai $\sigma \exists$ *inversā permutācija* σ^{-1} :

$$\sigma\sigma^{-1} = \sigma^{-1}\sigma = \text{id}.$$

- Permutāciju $\sigma : A \rightarrow A$ sauc par *ciklisku attēlojumu* vai *ciklu*, ja
- vai nu $|A| \geq 2$ un A elementus var sakārtot virknē (a_1, \dots, a_n) tā, ka $\sigma(a_i) = a_{i+1 \bmod n}$,
 - vai arī $|A| = 1$ (un kopas A vienīgais elements a apmierina vienādību $\sigma(a) = a$).

1.1. teorēma. (permutācijas sadalījums ciklos) Katrai galīgas kopas A permutācijai σ eksistē viennozīmīgi noteikts A sadalījums apakškopās A_1, \dots, A_m tāds, ka $\forall i$ σ sašaurinājums uz A_i ir cikls.

Var definēt permutācijas *ciklisko pierakstu* šādā veidā. Ja

$$A_1 = \{a_{11}, \dots, a_{1n_1}\}, \dots, A_m = \{a_{m1}, \dots, a_{mn_m}\},$$

$$\sigma(a_{11}) = a_{12}, \dots, \sigma(a_{1n_1}) = a_{11}, \dots$$

$$\sigma(a_{m1}) = a_{m2}, \dots, \sigma(a_{mn_m}) = a_{m1},$$

tad $\sigma = (a_{11}a_{12}\dots a_{1n_1})\dots(a_{m1}a_{m2}\dots a_{mn_m})$ (katrs cikls atdalīts ar iekavām). Ciklus ar garumu 1 (*fiksētos punktus*) cikliskajā pierakstā neuzrāda.

1.1. piemērs. Permutāciju $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 2 & 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}$ var sadalīt divos ciklos $\{1, 5\} \cup \{2, 4, 3\}$ un apzīmēt kā $(15)(243)$.

1.1.2. Permutāciju darbība polinomu gredzenā

$\forall \sigma \in \Sigma_n$ un $\forall aX^\mu = aX_1^{\mu_1} \dots X_n^{\mu_n} \in k[X_1, \dots, X_n]$ definēsim termu $\sigma \circ (aX^\mu)$ ar šādu nosacījumu:

$$\sigma \circ (aX^\mu) = aX_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}.$$

1.2. piemērs. $(12) \circ (X_1 X_2^4 X_3^5) = X_2 X_1^4 X_3^5 = X_1^4 X_2 X_3^5$.

$\forall \sigma \in \Sigma_n$ un $\forall f = \sum_{\mu} a_{\mu} X_1^{\mu_1} \dots X_n^{\mu_n} \in k[X_1, \dots, X_n]$ definēsim polinomu $\sigma \circ f$ ar šādu nosacījumu:

$$\sigma \circ f = \sum_{\mu} \sigma \circ (a_{\mu} X^{\mu}) = \sum_{\mu} a_{\mu} X_{\sigma(1)}^{\mu_1} \dots X_{\sigma(n)}^{\mu_n}.$$

Tādējādi $\forall \sigma$ ir definēta σ -darbības funkcija

$$T_\sigma : k[X_1, \dots, X_n] \rightarrow k[X_1, \dots, X_n],$$

$$T_\sigma(f) = \sigma \circ f.$$

1.3. piemērs.

$$(23) \circ f = X_{\sigma(1)} + X_{\sigma(2)}X_{\sigma(3)} = X_1 + X_3X_2 = X_1 + X_2X_3 = f.$$

1.1.3. Simetrisko polinomu definīcija

$f \in k[X_1, \dots, X_n]$ saucim par *simetrisku polinomu (SP)*, ja

$$\sigma \circ f = f, \forall \sigma \in \Sigma_n.$$

Citiem vārdiem sakot, veicot jebkādu argumentu permutāciju, f nemainās, f ir *invariants attiecībā uz Σ_n darbību*. Visu SP kopu apzīmēsim ar $k[X_1, \dots, X_n]^S$.

1.4. piemērs. Simetriskie monomi - $a(X_1 \dots X_n)^m$.

Simetriskie polinomi - konstantes, $X_1 + X_2, X_1X_2 \in k[X_1, X_2]$,
 $X^2 + XY + Y^2 \in k[X, Y]$.

Nesimetriski polinomi - $X_1^2 X_2, X + 2Y$.

1.1.4. Simetrisko polinomu klases

Elementārie simetriski polinomi

SP saucsim par *elementāru SP*, ja tas ir izsakāms formā

$$e_m(X_1, X_2, \dots, X_n) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_m \leq n} X_{i_1} X_{i_2} \dots X_{i_m}.$$

Definēsim arī $e_0 = 1$. Redzam, ka $m \leq n$.

1.5. piemērs. $n = 1 \implies e_1(X) = X$.

$n = 2 \implies$

$$\begin{cases} e_1(X_1, X_2) = X_1 + X_2 \\ e_2(X_1, X_2) = X_1 X_2 \end{cases}$$

$n = 3 \implies$

$$\begin{cases} e_1(X_1, X_2, X_3) = X_1 + X_2 + X_3, \\ e_2(X_1, X_2, X_3) = X_1 X_2 + X_1 X_3 + X_2 X_3, \\ e_3(X_1, X_2, X_3) = X_1 X_2 X_3. \end{cases}$$

1.2. piezīme. Atverot iekavas izteiksmei

$$(X - r_1)(X - r_2)\dots(X - r_n),$$

iegūsim

$$X^n - e_1(r_1, \dots, r_n)X^{n-1} + e_2(r_1, \dots, r_n)X^{n-2} + \dots + (-1)^{n+1}e_n(r_1, \dots, r_n).$$

1.2. teorēma. (Vieta teorēma) $f(X) \in k[X]$ - normalizēts polinoms, $\deg(f) = n$, $\{\{r_1, \dots, r_n\}\} = \mathcal{V}_f$ (saknes var atkārtoties).

$$f(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_0 \iff a_k = (-1)^{n-k}e_{n-k}(r_1, \dots, r_n).$$

PIERĀDĪJUMS Formulu pārbaude. ■

Pakāpju summu simetriski polinomi

SP sauksim par *pakāpju summu SP*, ja tas ir izsakāms formā

$$p_m(X_1, X_2, \dots, X_n) = \sum_{i=1}^n X_i^m.$$

Definēsim arī $p_0 = \sum_{i=1}^n 1 = n$.

1.6. piemērs. $n = 1 \implies p_m(X) = X^m$.

$$n = 3 \implies p_m(X_1, X_2, X_3) = X_1^m + X_2^m + X_3^m.$$

Orbītu simetriski polinomi

Ja $X^\mu = X_1^{\mu_1} \dots X_n^{\mu_n}$, tad par μ -orbītu m_μ sauksim

$$S(X^\mu) = \sum_{\sigma \in \Sigma_n} \sigma \circ X^\mu = \sum_{\sigma \in \Sigma_n} X_{\sigma(1)}^{\mu_1} X_{\sigma(2)}^{\mu_2} \dots X_{\sigma(n)}^{\mu_n}.$$

1.7. piemērs. $m_{(2,0)} = S(X_1^2) = S(X_i^2) = (n-1)! \sum_{i=1}^n X_i^2$.

$$m_{(1,1)} = S(X_1 X_2) = 2(n-1)! \sum_{i < j}^n X_i X_j.$$

$$e_k = c \cdot S(X_1 X_2 \dots X_k).$$

1.2. Simetrisko polinomu īpašības

1.2.1. Permutāciju darbības īpašības

Darbības bijektivitāte un pakāpes saglabāšana

1.3. teorēma.

1. $\forall \sigma \in \Sigma_n$ σ -darbība termu kopā ir bijektīva funkcija.
2. Ja f ir homogēns polinoms ar pakāpi m , tad $\sigma \circ f$ arī ir homogēns polinoms ar pakāpi m .

PIERĀDĪJUMS Patstāvīga lasīšana.

1. Injektivitāte

$$\sigma \circ (aX_1^{\mu_1} \dots X_n^{\mu_n}) = \sigma \circ (bX_1^{\lambda_1} \dots X_n^{\lambda_n}) \implies$$

$$aX_{\sigma(1)}^{\mu_1} \dots X_{\sigma(n)}^{\mu_n} = bX_{\sigma(1)}^{\lambda_1} \dots X_{\sigma(n)}^{\lambda_n} \implies \forall i : \mu_i = \lambda_i \implies$$

$$X^\mu = X^\lambda \wedge a = b.$$

Sirjektivitāte $\forall \nu$ izpildās

$$aX_1^{\nu_1} \dots X_n^{\nu_n} = aX_{\sigma\sigma^{-1}(1)}^{\nu_1} \dots X_{\sigma\sigma^{-1}(n)}^{\nu_n} = \sigma \circ (aX_{\sigma^{-1}(1)}^{\nu_1} \dots X_{\sigma^{-1}(n)}^{\nu_n}).$$

$$2. \deg(\sigma \circ X^\mu) = \deg(X^\mu). \blacksquare$$

Darbība uz monotoniem termiem

Termu $aX^\mu = aX^{(\mu_1, \dots, \mu_n)}$ sauksim par monotonu, ja

$$\mu_1 \geq \dots \geq \mu_n.$$

1.4. teorēma. aX^μ ir monotons $\implies \sigma \circ (aX^\mu) \preceq aX^\mu, \forall \sigma.$

PIERĀDĪJUMS Ievērosim, ka termam $\rho \circ (aX^\mu)$ kāpinātājs pie X_i ir vienāds ar $\mu_{\rho^{-1}(i)}$ - aX^μ kāpinātāju pie $X_{\rho^{-1}(i)}$. Šī iemesla dēļ sākotnējo permutāciju ērtāk apzīmēt ar σ^{-1} .

Pieņemsim pretējo: $\exists \sigma^{-1} \in \Sigma_n : \sigma^{-1} \circ (aX^\mu) \succ aX^\mu \implies$

$$\exists \sigma : (\mu_1, \dots, \mu_n) \prec (\mu_{\sigma(1)}, \dots, \mu_{\sigma(n)}) \implies$$

$\exists i : \mu_{\sigma(i)} > \mu_i$ un $\mu_{\sigma(j)} = \mu_j, \forall j < i$. Tas nav iespējams, jo visi μ_l , kas ir lielāki nekā μ_i , jau ir starp elementiem $\{\mu_{\sigma(1)}, \dots, \mu_{\sigma(i-1)}\}$.



1.5. teorēma. Permutācijas darbība polinomu gredzenā saglabā summu un reizinājumu.

PIERĀDĪJUMS

Saskaitīšana

$$\left\{ \begin{array}{l} f = \sum_{i_1, \dots, i_n} a_{i_1 \dots i_n} X_1^{i_1} \dots X_n^{i_n} \\ g = \sum_{i_1, \dots, i_n} b_{i_1 \dots i_n} X_1^{i_1} \dots X_n^{i_n} \end{array} \right. \implies$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma \circ f = \sum_{i_1, \dots, i_n} a_{i_1 \dots i_n} X_{\sigma(1)}^{i_1} \dots X_{\sigma(n)}^{i_n}, \\ \sigma \circ g = \sum_{i_1, \dots, i_n} b_{i_1 \dots i_n} X_{\sigma(1)}^{i_1} \dots X_{\sigma(n)}^{i_n}. \end{array} \right.$$

Redzam, ka

$$\begin{aligned} \sigma \circ (f + g) &= \sum_{i_1, \dots, i_n} (a_{i_1 \dots i_n} + b_{i_1 \dots i_n}) X_{\sigma(1)}^{i_1} \dots X_{\sigma(n)}^{i_n} = \\ &= \sum_{i_1, \dots, i_n} a_{i_1 \dots i_n} X_{\sigma(1)}^{i_1} \dots X_{\sigma(n)}^{i_n} + \sum_{i_1, \dots, i_n} b_{i_1 \dots i_n} X_{\sigma(1)}^{i_1} \dots X_{\sigma(n)}^{i_n} = \\ &= \sigma \circ f + \sigma \circ g = \sigma \circ f + \sigma \circ g. \end{aligned}$$

Reizināšana

Reizināšanas saglabāšanu no sākuma pierādīsim uz monomiem, pēc tam no tikko pierādītās summas saglabāšanas sekos reizināšanas saglabāšana patvaļīgiem polinomiem.

Redzam, ka

$$\begin{aligned} \sigma \circ (X_1^{\mu_1} \dots X_n^{\mu_n} \cdot X_1^{\nu_1} \dots X_n^{\nu_n}) &= \sigma \circ (X_1^{\mu_1 + \nu_1} \dots X_n^{\mu_n + \nu_n}) = \\ X_{\sigma(1)}^{\mu_1 + \nu_1} \dots X_{\sigma(n)}^{\mu_n + \nu_n} &= X_{\sigma(1)}^{\mu_1} \dots X_{\sigma(n)}^{\mu_n} \cdot X_{\sigma(1)}^{\nu_1} \dots X_{\sigma(n)}^{\nu_n} = \\ &(\sigma \circ X_1^{\mu_1} \dots X_n^{\mu_n}) \cdot (\sigma \circ X_1^{\nu_1} \dots X_n^{\nu_n}). \end{aligned}$$

Ja $f = \sum_i f_i$, $g = \sum_j g_j$, kur f_i, g_j ir termi, tad

$$\begin{aligned} \sigma \circ (fg) &= \sigma \circ \left(\sum_{i,j} f_i g_j \right) = \sum_{i,j} \sigma \circ (f_i g_j) = \sum_{i,j} (\sigma \circ f_i) (\sigma \circ g_j) = \\ \left(\sum_i \sigma \circ f_i \right) \left(\sum_j \sigma \circ g_j \right) &= (\sigma \circ \sum_i f_i) (\sigma \circ \sum_j g_j) = (\sigma \circ f) (\sigma \circ g). \blacksquare \end{aligned}$$

1.2.2. Simetrisko polinomu struktūra

1.6. teorēma. $f \in k[X_1, \dots, X_n]^S \implies f$ termu kopā σ -darbība ir bijektīva - $\exists f$ termu kopas sadalījums σ -darbības ciklos ar vienādiem koeficientiem.

PIERĀDĪJUMS

Saskaņā ar iepriekš pierādītu teorēmu, visu termu kopā σ -darbība ir bijektīva - visu termu kopu var sadalīt galīgās apakškopās, katrā no kurām σ -darbības sašaurinājums ir cikls.

Ja f termu kopa nav σ -darbības ciklu apvienojums, tad $\sigma \circ f \neq f$.

Ja f termu kopa ir σ -darbības ciklu apvienojums, tad $\sigma \circ f = f$.



1.8. piemērs. $X^3 + 2X^2Y + 2XY^2 + Y^3$.

1.7. teorēma. Simetriska polinoma vecākais terms ir monotons.

PIERĀDĪJUMS Pieņemsim, ka SP f vecākais terms ir

$$\mathcal{H} = aX_1^{\mu_1} \dots X_i^{\mu_i} X_{i+1}^{\mu_{i+1}} \dots X_n^{\mu_n}, \text{ kur } \mu_i < \mu_{i+1}.$$

f ir SP $\implies f$ satur termu $\tau \circ \mathcal{H}$, kur $\tau = (i, i + 1)$. Redzam, ka

$$\tau \circ \mathcal{H} = aX_1^{\mu_1} \dots X_i^{\mu_{i+1}} X_{i+1}^{\mu_i} \dots X_n^{\mu_n} \succ \mathcal{H} - \text{pretruna.} \blacksquare$$

1.8. teorēma. \forall SP var izteikt orbītu lineāras kombinācijas veidā:

$$f \in k[X_1, \dots, X_n]^S \implies f = \sum_{\mu} c_{\mu} S(X^{\mu}).$$

PIERĀDĪJUMS Pietiek pierādīt apgalvojumu homogēnam SP f .

f satur $a_1 X^{\mu} \implies f$ satur $a_1(\sigma \circ (X^{\mu}))$, $\forall \sigma$. Izvēlēsim tādu monomu $X^{\mu_1} = \sigma_1 \circ (X^{\mu})$, kas ir lielākais leksikogrāfiskajā sakārtojumā. Definēsim $f_1 = f - a_1 S(X^{\mu_1})$.

$f_1 \neq 0 \implies f_1$ satur vismaz vienu termu $a_2 X^{\mu'}$, kur $X^{\mu'} \prec X^{\mu_1} \implies f_1$ satur $a_2(\sigma \circ (X^{\mu'}))$, $\forall \sigma$. Izvēlēsim tādu monomu $X^{\mu_2} = \sigma_2 \circ (X^{\mu'})$, kas ir lielākais leksikogrāfiskajā sakārtojumā. Definēsim $f_2 = f_1 - a_2 S(X^{\mu_2})$.

Turpināsim šo procesu. Tā kā lielākie atlikušie orbītu vecākie termi kļūst stingri mazāki, tad pēc galīga skaita soļiem process apstāsies un iegūsim $f_l = 0$. Seko teorēmas apgalvojums. ■

1.9. piemērs.

$$(X_1 + X_2)(X_1 + X_3)(X_2 + X_3) = X_1^2 X_2 + X_1^2 X_3 + X_1 X_2^2 + X_1 X_3^2 + X_2^2 X_3 + X_2 X_3^2 + 2X_1 X_2 X_3 = S(X_1^2 X_2) + \frac{1}{3} S(X_1 X_2 X_3).$$

1.2.3. Simetriskie polinomi veido apakšgredzenu

1.9. teorēma.

1. $\forall n$ $k[X_1, \dots, X_n]^S$ ir lineāra telpa.
2. $\forall n$ $k[X_1, \dots, X_n]^S$ ir $k[X_1, \dots, X_n]$ apakšgredzens.

PIERĀDĪJUMS Jāpierāda, ka divu SP f un g summa un f reizinājums ar g ir SP:

$$\begin{aligned}\sigma \circ (f + g) &= \sigma \circ f + \sigma \circ g = f + g, \forall \sigma, \\ \sigma \circ (fg) &= (\sigma \circ f)(\sigma \circ g) = fg, \forall \sigma. \blacksquare\end{aligned}$$

1.3. Simetrisko polinomu pamatteorēma

1.10. teorēma. $\forall f \in k[X_1, \dots, X_n]^S$ var viennozīmīgi izteikt formā

$$f(X_1, \dots, X_n) = g(e_1, \dots, e_n), \text{ kur } g \in k[Y_1, \dots, Y_n].$$

PIERĀDĪJUMS \forall SP f ir homogēnu SP summa \implies pietiek pierādīt apgalvojumu, ja f ir homogēns SP.

Eksistence un algoritms

Pierādīsim, ka $\forall f \in k[X_1, \dots, X_n]^S \exists g \in k[Y_1, \dots, Y_n]$ tāds, ka

$$f(X_1, \dots, X_n) = g\left(e_1(X_1, \dots, X_n), \dots, e_n(X_1, \dots, X_n)\right).$$

Pamatideja - sākot ar f veiksīm "redukcijas" atņemot polinomus formā $ae_1^{\gamma_1} \dots e_n^{\gamma_n}$ tā, lai katra šāda "redukcija" samazinātu vecāko termu. Izrādās, ka tas vienmēr ir iespējams. Beigās iegūsim 0, tātad f ir izsakāms kā $ae_1^{\gamma_1} \dots e_n^{\gamma_n}$ tipa polinomu summa.

Pieņemsim, ka $\mathcal{H}(f) = aX_1^{\mu_1} \dots X_n^{\mu_n}$, kur $\mu_i \geq \mu_{i+1}$.

Definēsim pirmo "redukciju":

$$f_1 = f - ae_1^{\mu_1 - \mu_2} e_2^{\mu_2 - \mu_3} \dots e_n^{\mu_n} \in k[X_1, \dots, X_n]^S.$$

Pierādīsim, ka $\mathcal{H}(f) \succ \mathcal{H}(f_1)$. Redzam, ka saskaņā ar vecākā

terma multiplikatīvitatē īpašību

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(ae_1^{\mu_1 - \mu_2} e_2^{\mu_2 - \mu_3} \dots e_n^{\mu_n}) &= a\mathcal{H}(e_1^{\mu_1 - \mu_2})\mathcal{H}(e_2^{\mu_2 - \mu_3})\dots\mathcal{H}(e_n^{\mu_n}) = \\ &= a\mathcal{H}(e_1)^{\mu_1 - \mu_2}\mathcal{H}(e_2)^{\mu_2 - \mu_3}\dots\mathcal{H}(e_n)^{\mu_n} = \\ aX_1^{\mu_1 - \mu_2}(X_1X_2)^{\mu_2 - \mu_3}\dots(X_1\dots X_n)^{\mu_n} &= aX_1^{\mu_1}X_2^{\mu_2}\dots X_n^{\mu_n} = \mathcal{H}(f). \end{aligned}$$

Seko, ka $f_1 = f - ae_1^{\mu_1 - \mu_2} e_2^{\mu_2 - \mu_3} \dots e_n^{\mu_n}$ vecākie termi saīsinās un $\mathcal{H}(f) \succ \mathcal{H}(f_1)$.

Pieņemsim, ka $\mathcal{H}(f_1) = bX_1^{\nu_1} \dots X_n^{\nu_n}$, kur $\nu_i \geq \nu_{i+1}$.

Definēsim otro "redukciju":

$$f_2 = f_1 - be_1^{\nu_1 - \nu_2} e_2^{\nu_2 - \nu_3} \dots e_n^{\nu_n}.$$

Sprīžot līdzīgi, iegūsim, ka $\mathcal{H}(f) \succ \mathcal{H}(f_1) \succ \mathcal{H}(f_2)$.

Turpinot, pēc galīga skaita soļiem iegūsim SP $f_l = 0$, tāpēc

$$f = ae_1^{\mu_1 - \mu_2} \dots e_n^{\mu_n} + be_1^{\nu_1 - \nu_2} \dots e_n^{\nu_n} + \dots = g(e_1, \dots, e_n) \in k[e_1, \dots, e_n].$$

Vienīgums Pieņemsim, ka \exists divi polinomi $g_1, g_2 \in k[Y_1, \dots, Y_n]$ tādi, ka

$$f = g_1(e_1, \dots, e_n) = g_2(e_1, \dots, e_n) \implies$$

$$\hat{g} = g_1 - g_2 \neq 0 \text{ kā polinoms.}$$

No otras puses, ievietojot \hat{g} argumentu vietā e_i , iegūsim, ka

$$\hat{g}(e_1(X_1, \dots, X_n), \dots, e_n(X_1, \dots, X_n)) = 0.$$

Katram \hat{g} monomam $aY_1^{\lambda_1} \dots Y_n^{\lambda_n}$, $a \neq 0$, izpildās

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(ae_1^{\lambda_1} e_2^{\lambda_2} \dots e_n^{\lambda_n}) &= aX_1^{\lambda_1} (X_1 X_2)^{\lambda_2} \dots (X_1 X_2 \dots X_n)^{\lambda_n} = \\ & aX_1^{\lambda_1 + \dots + \lambda_n} X_2^{\lambda_2 + \dots + \lambda_n} \dots X_n^{\lambda_n}. \end{aligned}$$

Funkcija

$$(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \mapsto (\lambda_1 + \dots + \lambda_n, \lambda_2 + \dots + \lambda_n, \dots, \lambda_n)$$

ir injektīva \implies dažādu $\hat{g}(Y)$ monomu vecākie termi pēc e_i ievietošanas nevar saīsināties $\implies \mathcal{H}(\hat{g}(e)) \neq 0 \implies \hat{g}(e) \neq 0$ - pretruna.



1.3. piezīme. Simetrisko polinomu pamatteorēmu izmanto vienādojumu sistēmu un nevienādību risināšanā.

1.4. Algoritmi SP izteikšanai ar elementāro SP palīdzību

SP izteikšanu ar elementāro SP palīdzību saucim par tā *elementarizāciju*.

1.4.1. Teorēmas algoritms

Var izmantot algoritmu, kas ir dots teorēmas pierādījumā.

1.10. piemērs. Elementarizēsim $f = X_1^4 + X_2^4$:

$$1. f \rightarrow f_1 = f - e_1^4 = -4X_1^3X_2 - 6X_1^2X_2^2 - 4X_1X_2^3.$$

$$2. f_1 \rightarrow f_2 = f_1 + 4e_1^2e_2 = 2X_1^2X_2^2.$$

$$3. f_2 \rightarrow f_3 = f_2 - 2e_2^2.$$

$$\Rightarrow f = e_1^4 - 4e_1^2e_2 + 2e_2^2.$$

1.4.2. Nenoteikto koeficientu metode

Ja $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ ir pakāpju vektors, tad apzīmēsim

$$E(\alpha) = e_1^{\alpha_1} e_2^{\alpha_2} \dots e_n^{\alpha_n}.$$

Katram $m \in \mathbb{N}$ visu vienādojuma

$$1 \cdot \alpha_1 + 2 \cdot \alpha_2 + \dots + n \cdot \alpha_n = m$$

atrisinājumu kopu apzīmēsim ar \mathcal{T}_m .

Algoritmu var paātrināt šādā veidā:

1. Izteikt f kā homogēnu SP summu $f_1 + \dots + f_d$.
2. $\forall f_i$ meklējam formā

$$f_i = \sum_{\tau \in \mathcal{T}_i} c_\tau E(\tau),$$

kur koeficienti c_τ tiek atrasti liekot X_i vietā konkrētus mazus veselus skaitļus, parasti $0, \pm 1, \pm 2, \dots$

1.11. piemērs. Elementarizēsim $X_1^5 + X_2^5 \in \mathbb{Q}[X_1, X_2]$. Tas ir homogēns un vienāds ar $S(X_1^5)$. Elementarizācija ir jāmeklē formā

$$X_1^5 + X_2^5 = e_1^5 + ae_1^3e_2 + be_1e_2^2, \text{ kur } a, b - \text{nezināmi.}$$

$$(X_1, X_2) = (1, 1) \implies 2 = 2^5 + a \cdot 2^3 + b \cdot 2.$$

$$(X_1, X_2) = (1, 2) \implies 1 + 2^5 = 3^5 + a \cdot 3^3 \cdot 2 + b \cdot 3 \cdot 2^2.$$

Iegūsim sistēmu

$$\begin{cases} 4a + b = -15 \\ 9a + 2b = -35 \end{cases} \implies (a, b) = (-5, 5) \implies$$

$$X_1^5 + X_2^5 = e_1^4 - 5e_1^3e_2 + 5e_1e_2^2.$$

2. 8.mājasdarbs

2.1. Obligātie uzdevumi

8.1 Izteikt SP

$$(X_1X_2 + X_3X_4)(X_1X_3 + X_2X_4)(X_1X_4 + X_2X_3)$$

formā $\sum_{\mu} c_{\mu} S(X^{\mu})$.

8.2 Elementarizēt dotos SP:

- (a) $X_1^3 + X_2^3$;
- (b) $X_1^3X_2 + X_1^3X_3 + X_1X_2^3 + X_1X_3^3 + X_2^3X_3 + X_2X_3^3$;
- (c) $(X_1X_2 + X_3)(X_1X_3 + X_2)(X_2X_3 + X_1)$;
- (d) $\left[\prod_{i < j \leq n} (X_i - X_j) \right]^2$, ja $n \in \{2, 3\}$.

8.3 Atrast SP g vērtību, ja tā argumenti ir polinoma f saknes:

- (a) $g = X_1^3 + X_2^3 - X_1X_2$, $f = X^2 - X - 1$;
- (b) $g = X_1(X_2 + X_3) + X_2(X_1 + X_3) + X_3(X_1 + X_2)$, $f = X^3 + X^2 - 1$.

8.4 c_1, c_2, c_3 ir vienādojuma

$$X^3 + 2X^2 + 3X + 4 = 0$$

saknes. Aprēķiniet $\frac{1}{c_1^2} + \frac{1}{c_2^2} + \frac{1}{c_3^2}$.

2.2. Paaugstinātas grūtības un pētnieciska rakstura uzdevumi

8.5 Vispāriniet apgalvojumu par permutācijas sadalījumu ciklos uz šādiem gadījumiem:

- (a) kopa A ir galīga, funkcija $f : A \rightarrow A$ nav bijektīva;
- (b) kopa A ir bezgalīga, funkcija $f : A \rightarrow A$ ir bijektīva, f kāрта ir galīga: $\exists n : f^n = \text{id}$;
- (c) kopa A ir bezgalīga, funkcija $f : A \rightarrow A$ ir bijektīva;
- (d) kopa A ir bezgalīga, funkcija $f : A \rightarrow A$ nav bijektīva.

8.6 Klasificējiet $k[X_1, \dots, X_n]$ monomu orbītas.